

## ラゲブリオカプセル200mg

### 【この薬は？】

販売名	ラゲブリオカプセル200mg LAGEVRIO Capsules 200mg
一般名	モルヌピラビル Molnupiravir
含有量 (1カプセル中)	200mg

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するとき特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、抗ウイルス剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）のウイルスRNAに取り込まれることにより、ウイルスの増殖を阻害し、抗ウイルス作用を示します。
- ・次の病気の人に処方されます。  
**SARS-CoV-2による感染症**
- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

### 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にラゲブリオカプセルに含まれる成分で過敏症のあった人
  - ・妊婦または妊娠している可能性がある人
- 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
- ・授乳中の人
- 妊娠する可能性がある人は、この薬を使用する前に医師や薬剤師が妊娠していないこと及び妊娠している可能性がないことを確認します。また、以下について説明を受け、十分に理解してください。
- ・この薬は胎児に影響を及ぼす可能性があること。
  - ・この薬の使用中に妊娠がわかったり妊娠が疑われたりした場合には、ただちに使用を中止すること。
  - ・この薬の使用のおよび使用終了後4日の間に妊娠していたことがわかったり疑われたりした場合には、すぐに医師または薬剤師に相談すること。

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

- ・この薬は、SARS-CoV-2による感染症の症状があらわれてから速やかに使用が開始されます。
- ・飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

販売名	ラゲブリオカプセル200mg
一回量	4カプセル
飲む回数	1日2回
飲む期間	5日間

- ・この薬は食事の有無にかかわらず飲むことができます。

### ●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

### ●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

### ●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・妊婦または妊娠している可能性がある人はこの薬を使用することはできません。
- ・妊娠する可能性がある人は、この薬の使用のおよび使用終了後4日間は適切な避妊をしてください。
- ・この薬の使用のおよび使用終了後4日の間に妊娠していたことがわかったり疑われたりした場合には、ただちに使用を中止して医師または薬剤師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 副作用は？




特にご注意いただきたい重大な副作用と、主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
アナフィラキシー	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸（どうき）、息苦しい

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用の表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	ふらつき
口や喉	喉のかゆみ
胸部	動悸、息苦しい
皮膚	全身のかゆみ、じんま疹

## 【この薬の形は？】

販売名	ラゲブリオカプセル200mg	
形状*	硬カプセル	
		
識別コード*	なし	 82
長径	21.7mm	
短径	7.64mm	
重さ	285.7mg	
色	赤茶色不透明	

\*：識別コード有り又は無しのどちらか片方のカプセルが処方されます。

## 【この薬に含まれているのは？】

有効成分	モルヌピラビル
添加剤	内容物：ヒドロキシプロピルセルロース、結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム カプセル：ヒプロメロース、三二酸化鉄、酸化チタン

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：MSD株式会社 (<http://www.msd.co.jp>)

MSDカスタマーサポートセンター

フリーダイヤル：0120-024-964

受付時間：9：00～17：30

(土日祝日・製造販売会社休日を除く)