

ロタテック[®]内用液

接種期間早見表

うるう年を除く

日	月	火	水	木	金	土
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	15	16	17
			22	23	24	25
				30	1	2



製造販売元(輸入) [資料請求先]
MSD株式会社

〒102-8667 東京都千代田区九段北 1-13-12 北の丸スクエア
<http://www.msd.co.jp/>
【MSDカスタマーサポートセンター】
医療関係者の方(MSD製品全般) 0120-024-961
(ワクチン専用) 0120-024-797
受付時間: 9:00~17:30(土日祝日・当社休日を除く)

1月 生まれのお子様

誕生日	1回目接種		2回目接種	3回目接種
	6週0日から	14週6日まで (初回接種推奨)	24週0日まで	28週0日まで
1/1	2/12	4/15	6/18	7/16
1/2	2/13	4/16	6/19	7/17
1/3	2/14	4/17	6/20	7/18
1/4	2/15	4/18	6/21	7/19
1/5	2/16	4/19	6/22	7/20
1/6	2/17	4/20	6/23	7/21
1/7	2/18	4/21	6/24	7/22
1/8	2/19	4/22	6/25	7/23
1/9	2/20	4/23	6/26	7/24
1/10	2/21	4/24	6/27	7/25
1/11	2/22	4/25	6/28	7/26
1/12	2/23	4/26	6/29	7/27
1/13	2/24	4/27	6/30	7/28
1/14	2/25	4/28	7/1	7/29
1/15	2/26	4/29	7/2	7/30
1/16	2/27	4/30	7/3	7/31
1/17	2/28	5/1	7/4	8/1
1/18	3/1	5/2	7/5	8/2
1/19	3/2	5/3	7/6	8/3
1/20	3/3	5/4	7/7	8/4
1/21	3/4	5/5	7/8	8/5
1/22	3/5	5/6	7/9	8/6
1/23	3/6	5/7	7/10	8/7
1/24	3/7	5/8	7/11	8/8
1/25	3/8	5/9	7/12	8/9
1/26	3/9	5/10	7/13	8/10
1/27	3/10	5/11	7/14	8/11
1/28	3/11	5/12	7/15	8/12
1/29	3/12	5/13	7/16	8/13
1/30	3/13	5/14	7/17	8/14
1/31	3/14	5/15	7/18	8/15

2月 生まれのお子様

誕生日	1回目接種		2回目接種	3回目接種
	6週0日から	14週6日まで (初回接種推奨)	24週0日まで	28週0日まで
2/1	3/15	5/16	7/19	8/16
2/2	3/16	5/17	7/20	8/17
2/3	3/17	5/18	7/21	8/18
2/4	3/18	5/19	7/22	8/19
2/5	3/19	5/20	7/23	8/20
2/6	3/20	5/21	7/24	8/21
2/7	3/21	5/22	7/25	8/22
2/8	3/22	5/23	7/26	8/23
2/9	3/23	5/24	7/27	8/24
2/10	3/24	5/25	7/28	8/25
2/11	3/25	5/26	7/29	8/26
2/12	3/26	5/27	7/30	8/27
2/13	3/27	5/28	7/31	8/28
2/14	3/28	5/29	8/1	8/29
2/15	3/29	5/30	8/2	8/30
2/16	3/30	5/31	8/3	8/31
2/17	3/31	6/1	8/4	9/1
2/18	4/1	6/2	8/5	9/2
2/19	4/2	6/3	8/6	9/3
2/20	4/3	6/4	8/7	9/4
2/21	4/4	6/5	8/8	9/5
2/22	4/5	6/6	8/9	9/6
2/23	4/6	6/7	8/10	9/7
2/24	4/7	6/8	8/11	9/8
2/25	4/8	6/9	8/12	9/9
2/26	4/9	6/10	8/13	9/10
2/27	4/10	6/11	8/14	9/11
2/28	4/11	6/12	8/15	9/12

ロタテック[®]内用液の接種スケジュール | ロタテック[®]内用液の初回接種は6週齢以上とし、4週以上の間隔をおいて32週齢までに3回経口接種を行う。なお、初回接種は生後14週6日までにすることが推奨されている。

1月・2月

3月・4月

5月・6月

7月・8月

9月・10月

11月・12月

3月

生まれのお子様

誕生日	1回目接種		2回目接種	3回目接種
	6週0日から	14週6日まで (初回接種推奨)	24週0日まで	28週0日まで
3/1	4/12	6/13	8/16	9/13
3/2	4/13	6/14	8/17	9/14
3/3	4/14	6/15	8/18	9/15
3/4	4/15	6/16	8/19	9/16
3/5	4/16	6/17	8/20	9/17
3/6	4/17	6/18	8/21	9/18
3/7	4/18	6/19	8/22	9/19
3/8	4/19	6/20	8/23	9/20
3/9	4/20	6/21	8/24	9/21
3/10	4/21	6/22	8/25	9/22
3/11	4/22	6/23	8/26	9/23
3/12	4/23	6/24	8/27	9/24
3/13	4/24	6/25	8/28	9/25
3/14	4/25	6/26	8/29	9/26
3/15	4/26	6/27	8/30	9/27
3/16	4/27	6/28	8/31	9/28
3/17	4/28	6/29	9/1	9/29
3/18	4/29	6/30	9/2	9/30
3/19	4/30	7/1	9/3	10/1
3/20	5/1	7/2	9/4	10/2
3/21	5/2	7/3	9/5	10/3
3/22	5/3	7/4	9/6	10/4
3/23	5/4	7/5	9/7	10/5
3/24	5/5	7/6	9/8	10/6
3/25	5/6	7/7	9/9	10/7
3/26	5/7	7/8	9/10	10/8
3/27	5/8	7/9	9/11	10/9
3/28	5/9	7/10	9/12	10/10
3/29	5/10	7/11	9/13	10/11
3/30	5/11	7/12	9/14	10/12
3/31	5/12	7/13	9/15	10/13

4月

生まれのお子様

誕生日	1回目接種		2回目接種	3回目接種
	6週0日から	14週6日まで (初回接種推奨)	24週0日まで	28週0日まで
4/1	5/13	7/14	9/16	10/14
4/2	5/14	7/15	9/17	10/15
4/3	5/15	7/16	9/18	10/16
4/4	5/16	7/17	9/19	10/17
4/5	5/17	7/18	9/20	10/18
4/6	5/18	7/19	9/21	10/19
4/7	5/19	7/20	9/22	10/20
4/8	5/20	7/21	9/23	10/21
4/9	5/21	7/22	9/24	10/22
4/10	5/22	7/23	9/25	10/23
4/11	5/23	7/24	9/26	10/24
4/12	5/24	7/25	9/27	10/25
4/13	5/25	7/26	9/28	10/26
4/14	5/26	7/27	9/29	10/27
4/15	5/27	7/28	9/30	10/28
4/16	5/28	7/29	10/1	10/29
4/17	5/29	7/30	10/2	10/30
4/18	5/30	7/31	10/3	10/31
4/19	5/31	8/1	10/4	11/1
4/20	6/1	8/2	10/5	11/2
4/21	6/2	8/3	10/6	11/3
4/22	6/3	8/4	10/7	11/4
4/23	6/4	8/5	10/8	11/5
4/24	6/5	8/6	10/9	11/6
4/25	6/6	8/7	10/10	11/7
4/26	6/7	8/8	10/11	11/8
4/27	6/8	8/9	10/12	11/9
4/28	6/9	8/10	10/13	11/10
4/29	6/10	8/11	10/14	11/11
4/30	6/11	8/12	10/15	11/12

ロタテック[®]内用液の接種スケジュール | ロタテック[®]内用液の初回接種は6週齢以上とし、4週以上の間隔を置いて32週齢までに3回経口接種を行う。なお、初回接種は生後14週6日までにすることが推奨されている。

1月・2月

3月・4月

5月・6月

7月・8月

9月・10月

11月・12月

5月 生まれのお子様

誕生日	1回目接種			2回目接種	3回目接種
	6週0日から	14週6日まで (初回接種推奨)	24週0日まで	28週0日まで	32週0日まで
5/1	6/12	8/13	10/16	11/13	12/11
5/2	6/13	8/14	10/17	11/14	12/12
5/3	6/14	8/15	10/18	11/15	12/13
5/4	6/15	8/16	10/19	11/16	12/14
5/5	6/16	8/17	10/20	11/17	12/15
5/6	6/17	8/18	10/21	11/18	12/16
5/7	6/18	8/19	10/22	11/19	12/17
5/8	6/19	8/20	10/23	11/20	12/18
5/9	6/20	8/21	10/24	11/21	12/19
5/10	6/21	8/22	10/25	11/22	12/20
5/11	6/22	8/23	10/26	11/23	12/21
5/12	6/23	8/24	10/27	11/24	12/22
5/13	6/24	8/25	10/28	11/25	12/23
5/14	6/25	8/26	10/29	11/26	12/24
5/15	6/26	8/27	10/30	11/27	12/25
5/16	6/27	8/28	10/31	11/28	12/26
5/17	6/28	8/29	11/1	11/29	12/27
5/18	6/29	8/30	11/2	11/30	12/28
5/19	6/30	8/31	11/3	12/1	12/29
5/20	7/1	9/1	11/4	12/2	12/30
5/21	7/2	9/2	11/5	12/3	12/31
5/22	7/3	9/3	11/6	12/4	1/1
5/23	7/4	9/4	11/7	12/5	1/2
5/24	7/5	9/5	11/8	12/6	1/3
5/25	7/6	9/6	11/9	12/7	1/4
5/26	7/7	9/7	11/10	12/8	1/5
5/27	7/8	9/8	11/11	12/9	1/6
5/28	7/9	9/9	11/12	12/10	1/7
5/29	7/10	9/10	11/13	12/11	1/8
5/30	7/11	9/11	11/14	12/12	1/9
5/31	7/12	9/12	11/15	12/13	1/10

6月 生まれのお子様

誕生日	1回目接種			2回目接種	3回目接種
	6週0日から	14週6日まで (初回接種推奨)	24週0日まで	28週0日まで	32週0日まで
6/1	7/13	9/13	11/16	12/14	1/11
6/2	7/14	9/14	11/17	12/15	1/12
6/3	7/15	9/15	11/18	12/16	1/13
6/4	7/16	9/16	11/19	12/17	1/14
6/5	7/17	9/17	11/20	12/18	1/15
6/6	7/18	9/18	11/21	12/19	1/16
6/7	7/19	9/19	11/22	12/20	1/17
6/8	7/20	9/20	11/23	12/21	1/18
6/9	7/21	9/21	11/24	12/22	1/19
6/10	7/22	9/22	11/25	12/23	1/20
6/11	7/23	9/23	11/26	12/24	1/21
6/12	7/24	9/24	11/27	12/25	1/22
6/13	7/25	9/25	11/28	12/26	1/23
6/14	7/26	9/26	11/29	12/27	1/24
6/15	7/27	9/27	11/30	12/28	1/25
6/16	7/28	9/28	12/1	12/29	1/26
6/17	7/29	9/29	12/2	12/30	1/27
6/18	7/30	9/30	12/3	12/31	1/28
6/19	7/31	10/1	12/4	1/1	1/29
6/20	8/1	10/2	12/5	1/2	1/30
6/21	8/2	10/3	12/6	1/3	1/31
6/22	8/3	10/4	12/7	1/4	2/1
6/23	8/4	10/5	12/8	1/5	2/2
6/24	8/5	10/6	12/9	1/6	2/3
6/25	8/6	10/7	12/10	1/7	2/4
6/26	8/7	10/8	12/11	1/8	2/5
6/27	8/8	10/9	12/12	1/9	2/6
6/28	8/9	10/10	12/13	1/10	2/7
6/29	8/10	10/11	12/14	1/11	2/8
6/30	8/11	10/12	12/15	1/12	2/9

ロタテック[®]内用液の接種スケジュール | ロタテック[®]内用液の初回接種は6週齢以上とし、4週以上の間隔を置いて32週齢までに3回経口接種を行う。なお、初回接種は生後14週6日までにすることが推奨されている。

7月 生まれのお子様

誕生日	1回目接種		2回目接種	3回目接種
	6週0日から	14週6日まで (初回接種推奨)	24週0日まで	28週0日まで
7/1	8/12	10/13	12/16	1/13
7/2	8/13	10/14	12/17	1/14
7/3	8/14	10/15	12/18	1/15
7/4	8/15	10/16	12/19	1/16
7/5	8/16	10/17	12/20	1/17
7/6	8/17	10/18	12/21	1/18
7/7	8/18	10/19	12/22	1/19
7/8	8/19	10/20	12/23	1/20
7/9	8/20	10/21	12/24	1/21
7/10	8/21	10/22	12/25	1/22
7/11	8/22	10/23	12/26	1/23
7/12	8/23	10/24	12/27	1/24
7/13	8/24	10/25	12/28	1/25
7/14	8/25	10/26	12/29	1/26
7/15	8/26	10/27	12/30	1/27
7/16	8/27	10/28	12/31	1/28
7/17	8/28	10/29	1/1	1/29
7/18	8/29	10/30	1/2	1/30
7/19	8/30	10/31	1/3	1/31
7/20	8/31	11/1	1/4	2/1
7/21	9/1	11/2	1/5	2/2
7/22	9/2	11/3	1/6	2/3
7/23	9/3	11/4	1/7	2/4
7/24	9/4	11/5	1/8	2/5
7/25	9/5	11/6	1/9	2/6
7/26	9/6	11/7	1/10	2/7
7/27	9/7	11/8	1/11	2/8
7/28	9/8	11/9	1/12	2/9
7/29	9/9	11/10	1/13	2/10
7/30	9/10	11/11	1/14	2/11
7/31	9/11	11/12	1/15	2/12

8月 生まれのお子様

誕生日	1回目接種		2回目接種	3回目接種
	6週0日から	14週6日まで (初回接種推奨)	24週0日まで	28週0日まで
8/1	9/12	11/13	1/16	2/13
8/2	9/13	11/14	1/17	2/14
8/3	9/14	11/15	1/18	2/15
8/4	9/15	11/16	1/19	2/16
8/5	9/16	11/17	1/20	2/17
8/6	9/17	11/18	1/21	2/18
8/7	9/18	11/19	1/22	2/19
8/8	9/19	11/20	1/23	2/20
8/9	9/20	11/21	1/24	2/21
8/10	9/21	11/22	1/25	2/22
8/11	9/22	11/23	1/26	2/23
8/12	9/23	11/24	1/27	2/24
8/13	9/24	11/25	1/28	2/25
8/14	9/25	11/26	1/29	2/26
8/15	9/26	11/27	1/30	2/27
8/16	9/27	11/28	1/31	2/28
8/17	9/28	11/29	2/1	3/1
8/18	9/29	11/30	2/2	3/2
8/19	9/30	12/1	2/3	3/3
8/20	10/1	12/2	2/4	3/4
8/21	10/2	12/3	2/5	3/5
8/22	10/3	12/4	2/6	3/6
8/23	10/4	12/5	2/7	3/7
8/24	10/5	12/6	2/8	3/8
8/25	10/6	12/7	2/9	3/9
8/26	10/7	12/8	2/10	3/10
8/27	10/8	12/9	2/11	3/11
8/28	10/9	12/10	2/12	3/12
8/29	10/10	12/11	2/13	3/13
8/30	10/11	12/12	2/14	3/14
8/31	10/12	12/13	2/15	3/15

ロタテック[®]内用液の接種スケジュール | ロタテック[®]内用液の初回接種は6週齢以上とし、4週以上の間隔をおいて32週齢までに3回経口接種を行う。なお、初回接種は生後14週6日までにすることが推奨されている。

1月・2月

3月・4月

5月・6月

7月・8月

9月・10月

11月・12月

9月 生まれのお子様

誕生日	1回目接種		2回目接種	3回目接種
	6週0日から	14週6日まで (初回接種推奨)	24週0日まで	28週0日まで
9/1	10/13	12/14	2/16	3/16
9/2	10/14	12/15	2/17	3/17
9/3	10/15	12/16	2/18	3/18
9/4	10/16	12/17	2/19	3/19
9/5	10/17	12/18	2/20	3/20
9/6	10/18	12/19	2/21	3/21
9/7	10/19	12/20	2/22	3/22
9/8	10/20	12/21	2/23	3/23
9/9	10/21	12/22	2/24	3/24
9/10	10/22	12/23	2/25	3/25
9/11	10/23	12/24	2/26	3/26
9/12	10/24	12/25	2/27	3/27
9/13	10/25	12/26	2/28	3/28
9/14	10/26	12/27	3/1	3/29
9/15	10/27	12/28	3/2	3/30
9/16	10/28	12/29	3/3	3/31
9/17	10/29	12/30	3/4	4/1
9/18	10/30	12/31	3/5	4/2
9/19	10/31	1/1	3/6	4/3
9/20	11/1	1/2	3/7	4/4
9/21	11/2	1/3	3/8	4/5
9/22	11/3	1/4	3/9	4/6
9/23	11/4	1/5	3/10	4/7
9/24	11/5	1/6	3/11	4/8
9/25	11/6	1/7	3/12	4/9
9/26	11/7	1/8	3/13	4/10
9/27	11/8	1/9	3/14	4/11
9/28	11/9	1/10	3/15	4/12
9/29	11/10	1/11	3/16	4/13
9/30	11/11	1/12	3/17	4/14

10月 生まれのお子様

誕生日	1回目接種		2回目接種	3回目接種
	6週0日から	14週6日まで (初回接種推奨)	24週0日まで	28週0日まで
10/1	11/12	1/13	3/18	4/15
10/2	11/13	1/14	3/19	4/16
10/3	11/14	1/15	3/20	4/17
10/4	11/15	1/16	3/21	4/18
10/5	11/16	1/17	3/22	4/19
10/6	11/17	1/18	3/23	4/20
10/7	11/18	1/19	3/24	4/21
10/8	11/19	1/20	3/25	4/22
10/9	11/20	1/21	3/26	4/23
10/10	11/21	1/22	3/27	4/24
10/11	11/22	1/23	3/28	4/25
10/12	11/23	1/24	3/29	4/26
10/13	11/24	1/25	3/30	4/27
10/14	11/25	1/26	3/31	4/28
10/15	11/26	1/27	4/1	4/29
10/16	11/27	1/28	4/2	4/30
10/17	11/28	1/29	4/3	5/1
10/18	11/29	1/30	4/4	5/2
10/19	11/30	1/31	4/5	5/3
10/20	12/1	2/1	4/6	5/4
10/21	12/2	2/2	4/7	5/5
10/22	12/3	2/3	4/8	5/6
10/23	12/4	2/4	4/9	5/7
10/24	12/5	2/5	4/10	5/8
10/25	12/6	2/6	4/11	5/9
10/26	12/7	2/7	4/12	5/10
10/27	12/8	2/8	4/13	5/11
10/28	12/9	2/9	4/14	5/12
10/29	12/10	2/10	4/15	5/13
10/30	12/11	2/11	4/16	5/14
10/31	12/12	2/12	4/17	5/15

ロタテック[®]内用液の接種スケジュール | ロタテック[®]内用液の初回接種は6週齢以上とし、4週以上の間隔をおいて32週齢までに3回経口接種を行う。なお、初回接種は生後14週6日までにすることが推奨されている。

1月・2月

3月・4月

5月・6月

7月・8月

9月・10月

11月・12月

11月 生まれのお子様

誕生日	1回目接種		2回目接種	3回目接種
	6週0日から	14週6日まで (初回接種推奨)	24週0日まで	28週0日まで
11/1	12/13	2/13	4/18	5/16
11/2	12/14	2/14	4/19	5/17
11/3	12/15	2/15	4/20	5/18
11/4	12/16	2/16	4/21	5/19
11/5	12/17	2/17	4/22	5/20
11/6	12/18	2/18	4/23	5/21
11/7	12/19	2/19	4/24	5/22
11/8	12/20	2/20	4/25	5/23
11/9	12/21	2/21	4/26	5/24
11/10	12/22	2/22	4/27	5/25
11/11	12/23	2/23	4/28	5/26
11/12	12/24	2/24	4/29	5/27
11/13	12/25	2/25	4/30	5/28
11/14	12/26	2/26	5/1	5/29
11/15	12/27	2/27	5/2	5/30
11/16	12/28	2/28	5/3	5/31
11/17	12/29	3/1	5/4	6/1
11/18	12/30	3/2	5/5	6/2
11/19	12/31	3/3	5/6	6/3
11/20	1/1	3/4	5/7	6/4
11/21	1/2	3/5	5/8	6/5
11/22	1/3	3/6	5/9	6/6
11/23	1/4	3/7	5/10	6/7
11/24	1/5	3/8	5/11	6/8
11/25	1/6	3/9	5/12	6/9
11/26	1/7	3/10	5/13	6/10
11/27	1/8	3/11	5/14	6/11
11/28	1/9	3/12	5/15	6/12
11/29	1/10	3/13	5/16	6/13
11/30	1/11	3/14	5/17	6/14

12月 生まれのお子様

誕生日	1回目接種		2回目接種	3回目接種
	6週0日から	14週6日まで (初回接種推奨)	24週0日まで	28週0日まで
12/1	1/12	3/15	5/18	6/15
12/2	1/13	3/16	5/19	6/16
12/3	1/14	3/17	5/20	6/17
12/4	1/15	3/18	5/21	6/18
12/5	1/16	3/19	5/22	6/19
12/6	1/17	3/20	5/23	6/20
12/7	1/18	3/21	5/24	6/21
12/8	1/19	3/22	5/25	6/22
12/9	1/20	3/23	5/26	6/23
12/10	1/21	3/24	5/27	6/24
12/11	1/22	3/25	5/28	6/25
12/12	1/23	3/26	5/29	6/26
12/13	1/24	3/27	5/30	6/27
12/14	1/25	3/28	5/31	6/28
12/15	1/26	3/29	6/1	6/29
12/16	1/27	3/30	6/2	6/30
12/17	1/28	3/31	6/3	7/1
12/18	1/29	4/1	6/4	7/2
12/19	1/30	4/2	6/5	7/3
12/20	1/31	4/3	6/6	7/4
12/21	2/1	4/4	6/7	7/5
12/22	2/2	4/5	6/8	7/6
12/23	2/3	4/6	6/9	7/7
12/24	2/4	4/7	6/10	7/8
12/25	2/5	4/8	6/11	7/9
12/26	2/6	4/9	6/12	7/10
12/27	2/7	4/10	6/13	7/11
12/28	2/8	4/11	6/14	7/12
12/29	2/9	4/12	6/15	7/13
12/30	2/10	4/13	6/16	7/14
12/31	2/11	4/14	6/17	7/15

ロタテック[®]内用液の接種スケジュール | ロタテック[®]内用液の初回接種は6週齢以上とし、4週以上の間隔をおいて32週齢までに3回経口接種を行う。なお、初回接種は生後14週6日までにすることが推奨されている。

1月・2月

3月・4月

5月・6月

7月・8月

9月・10月

11月・12月

週数早見カレンダー

ワクチン接種スケジュールを週数で設計できる仕様になっています。

1月					2月				3月			
1	8	15	22	29	5	12	19	26	5	12	19	26
2	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27
3	10	17	24	31	7	14	21	28	7	14	21	28
4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29
5	12	19	26	2	9	16	23	2	9	16	23	30
6	13	20	27	3	10	17	24	3	10	17	24	31
7	14	21	28	4	11	18	25	4	11	18	25	1

	7月					8月				9月			
25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24
26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25
27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26
28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27
29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28
30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29
1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30

週数早見
カレンダーの見方



基準とする日付から、横に水平に移動して下さい。1マス横が1週後の日付、2マス横が2週後の日付となります。

4月					5月				6月			
2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25
3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26
4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27
5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28
6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29
7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30
8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1

10月					11月				12月				
1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31
2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	
3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	
4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	
5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	
6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	
7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	

ロタテック[®]内用液の接種スケジュール | ロタテック[®]内用液の初回接種は6週齢以上とし、4週以上の間隔をおいて32週齢までに3回経口接種を行う。なお、初回接種は生後14週6日までに行うことが推奨されている。